

Refigura®

Als Kapseln und Sticks erhältlich. Zur unterstützenden Behandlung von Übergewicht, von Adipositas und zur Gewichtskontrolle im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung. Schlank werden, ohne zu hungern, 100% natürliche Wirkstoffe.



Microlax® Rektallösung

Anwendungsgebiete: Zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung (Obstipation) sowie bei Erkrankungen, die eine erleichterte Stuhlentleerung (Defäkation) erfordern. Zur Darmentleerung bei diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen im Enddarmbereich. Warnhinweis: Enthält Sorbinsäure.*



Octenisept® Wund-Desinfektion

Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Um möglichen Gewebeschädigungen vorzubeugen, darf das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert werden. Bei Wundkavitäten muss ein Abfluss jederzeit gewährleistet sein (z. B. Drainage, Lasche). Nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf, z. B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Die Anwendung im Auge ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.*



Femibion® 1

Frühschwangerschaft. Mit Folat-Booster für den schnellen Aufbau des Folat-Spiegels und 11 weiteren essenziellen Nährstoffen ab Feststellung der Schwangerschaft bis zum Ende der 12. Woche.



Femibion® 2

Schwangerschaft & Stillzeit. Mit Folat-Mix für den Erhalt des Folat-Spiegels und 12 weiteren essenziellen Nährstoffen ab der 13. Woche bis zum Ende der Stillzeit.



Femibion® Babyplanung

Kinderwunsch? Babyplanung? Schon jetzt ist auf eine ausreichende Folat-Versorgung zu achten. Der Rückenmarkskanal bei einem Baby schließt sich zwischen dem 22. und 28. Tag nach der Empfängnis, doch so früh ist die Schwangerschaft meist noch unbemerkt. Folsäure und Metafolin sind die beiden Folat-Lieferanten in femibion®.



Pantoprazol Puren protect

20 mg magensaftresistente Tabletten. Anwendungsgebiet: kurzzeitige Behandlung von Refluxsymptomen (zum Beispiel Sodbrennen, saures Aufstoßen) bei Erwachsenen.*



Voltaren® Schmerzgel forte

23,2 mg/g Gel. Wirkstoff: Diclofenac, Diethylaminsalz. Anwendungsgebiete: Erwachsene und Jugendliche über 14 Jahren: zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen infolge eines stumpfen Traumas, z. B. Sport- und Unfallverletzungen. Bei Jugendlichen über 14 Jahren ist das Arzneimittel zur Kurzzeitbehandlung vorgesehen. Warnhinweis: enthält Propylenglycol, Butylhydroxytoluol und ein eukalyptushaltiges Parfum.*



Octenisept® Gel

Heilungsförderndes Hydrogel zur schonenden, schmerzfreien Behandlung von Hautwunden und leichten Verbrennungen.



ilon® Lippencreme HS

Transparente und geschmacksneutrale Creme zur Lippenpflege vor, während und nach einem Herpesausbruch. Mit dem patentierten Mikroalgen-Aktivstoff Spiralin® und hochwertigen Pflanzenölen zur Pflege und zum Schutz herpesempfindlicher Lippen.



Keltican® forte

Rücken? Nervensache! Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Enthält wertvolle Nährstoffe, die Ihren Körper unterstützen können, geschädigte Nerven zu reparieren.



Fresubin® 2 kcal Drink Vanille

Hochkalorische Trinknahrung zur ergänzenden und vollständigen Ernährung. Energie- und eiweißreich (400 kcal Energie und 20 g Eiweiß pro 200-ml-Flasche).



Thomapyrin® Tension Duo

400 mg/100 mg Filmtabletten. Wirkstoffe: Ibuprofen und Coffein. Für Erwachsene zur kurzzeitigen Behandlung von akut auftretenden mäßig starken Schmerzen. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage angegeben.*



Probielle Reizdarm

Zum Diätmanagement bei Reizdarmsyndrom mit Verstopfung. Mit drei wissenschaftlich getesteten Bakterienstämmen. Praktische Einnahme, nur 1 Kapsel täglich, keine Aktivierungszeit, keine Kühlung notwendig. Vegan, frei von Laktose und Gluten sowie von künstlichen Farbstoffen.



Loperamid akut – 1 A Pharma®

2 mg Hartkapseln. Wirkstoff: Loperamidhydrochlorid. Anwendungsgebiet: zur symptomatischen Behandlung von akuten Durchfällen für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren, sofern keine ursächliche Therapie zur Verfügung steht. Eine über 2 Tage hinausgehende Behandlung mit Loperamid darf nur unter ärztlicher Verordnung und Verlaufsbeobachtung erfolgen. Enthält Lactose.*



Gingium® intens

120 mg Filmtabletten: Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete: symptomatische Behandlung von hirnorganisch bedingten geistigen Leistungseinbußen. Im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes bei fortschreitender Abnahme bzw. Verlust erworbener geistiger Fähigkeiten mit den Hauptbeschwerden: Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, Niedergeschlagenheit, Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. (Vor Behandlungsbeginn sollte geklärt werden, ob die Krankheitszeichen nicht auf einer spezifisch zu behandelnden Grunderkrankung beruhen.) Verlängerung der schmerzfreien Gehstrecke bei arterieller Verschlusskrankheit in den Gliedmaßen (Claudicatio intermittens im Stadium II nach FONTAINE) im Rahmen physikalisch-therapeutischer Maßnahmen. Durch Durchblutungsstörungen oder altersbedingte Rückbildungsvorgänge bedingte/r Schwindel bzw. Ohrgeräusche (unterstützende Behandlung). Enthält Lactose.*



Calcium-Sandoz® D Osteo

Kautabletten, 500 mg/400 I.E.: Wirkstoffe: Calciumcarbonat/Colecalciferol. Anwendungsgebiete: Calcium-Vitamin-D3-Präparat zur Vorbeugung und Behandlung von Vitamin-D- und Calcium-Mangelzuständen bei älteren Menschen und als Vitamin-D- und Calciumsupplement zur Unterstützung einer spezifischen Therapie zur Prävention und Behandlung der Osteoporose. Enthält Isomalt, Sucrose (Zucker).*

